

ANASTROZOL MEDAC 1 mg POTAHOVANÁ TABLETA

44/369/09-C

DR: O RP: 44/1296/97-C

D: MEDAC, GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE MBH,
HAMBURG, Německo

S: Anastrozolum 1 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s označením "A1" na jedné straně.
PVC/Al blistr.B: POR TBL FLM 20X1MG BLI kód SÚKL: 0121378
POR TBL FLM 28X1MG BLI kód SÚKL: 0121379
POR TBL FLM 30X1MG BLI kód SÚKL: 0121380
POR TBL FLM 84X1MG BLI kód SÚKL: 0121381
POR TBL FLM 98X1MG BLI kód SÚKL: 0121382
POR TBL FLM 100X1MG BLI kód SÚKL: 0121383
POR TBL FLM 300X1MG BLI kód SÚKL: 0121384

IS: Cytostatica

ATC: L02BG03

PE: 30

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba pokročilého stadia karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.

ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg

30/627/09-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Escitaloprami oxalas 12.78 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)

PP: Bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením "EC|10" na jedné straně a "G" na druhé straně tablety. Tabletou lze dělit na dvě stejné poloviny.

1. Čirý PVC//PVdC/Al blistr, krabička.

2. Polypropylenová nádobka.

B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0138970
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0138971
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0138972
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0138973
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0138974
POR TBL FLM 49X10MG BLI kód SÚKL: 0138975
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0138976
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0138977
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0138978
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0138979
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0138980
POR TBL FLM 180X10MG BLI kód SÚKL: 0138981
POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0138982
POR TBL FLM 49X10MG TBC kód SÚKL: 0138983
POR TBL FLM 100X10MG TBC kód SÚKL: 0138984
POR TBL FLM 200X10MG TBC kód SÚKL: 0138985
POR TBL FLM 250X10MG TBC kód SÚKL: 0138986
POR TBL FLM 500X10MG TBC kód SÚKL: 0138987

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Uchovávat při teplotě do 25°C.

1. Blistry: uchovávat v původním obalu.
2. Plastové nádobky: nádobku těsně uzavírat.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITALOPRAM MYLAN 15 mg

30/628/09-C

DR: O RP: 30/492/07-C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Escitaloprami oxalas 19.17 mg
(odp. Escitalopramum 15 mg)

PP: Bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením "EC|15" na jedné straně a "G" na druhé straně tablety. Tabletou lze dělit na dvě stejné poloviny.

1. Čirý PVC//PVdC/Al blister, krabička.
2. Polypropylenová nádobka.

B: POR TBL FLM 10X15MG BLI kód SÚKL: 0138988
POR TBL FLM 14X15MG BLI kód SÚKL: 0138989
POR TBL FLM 20X15MG BLI kód SÚKL: 0138990
POR TBL FLM 28X15MG BLI kód SÚKL: 0138991
POR TBL FLM 30X15MG BLI kód SÚKL: 0138992
POR TBL FLM 49X15MG BLI kód SÚKL: 0138993
POR TBL FLM 50X15MG BLI kód SÚKL: 0138994
POR TBL FLM 56X15MG BLI kód SÚKL: 0138995
POR TBL FLM 60X15MG BLI kód SÚKL: 0138996
POR TBL FLM 90X15MG BLI kód SÚKL: 0138997
POR TBL FLM 100X15MG BLI kód SÚKL: 0138998
POR TBL FLM 180X15MG BLI kód SÚKL: 0138999
POR TBL FLM 200X15MG BLI kód SÚKL: 0139000
POR TBL FLM 49X15MG TBC kód SÚKL: 0139001
POR TBL FLM 100X15MG TBC kód SÚKL: 0139002
POR TBL FLM 200X15MG TBC kód SÚKL: 0139003
POR TBL FLM 250X15MG TBC kód SÚKL: 0139004
POR TBL FLM 500X15MG TBC kód SÚKL: 0139005

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Uchovávat při teplotě do 25°C.

1. Blistry: uchovávat v původním obalu.
2. Plastové nádobky: nádobku těsně uzavírat.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg

30/629/09-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Escitaloprami oxalas 25.56 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením "EC|20" na jedné

straně a "G" na druhé straně tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

1. Čirý PVC//PVdC/Al blistr, krabička.

2. Polypropylenová nádobka.

- B: POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0139006
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0139007
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0139008
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0139009
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0139010
POR TBL FLM 49X20MG BLI kód SÚKL: 0139011
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0139012
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0139013
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0139014
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0139015
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0139016
POR TBL FLM 180X20MG BLI kód SÚKL: 0139017
POR TBL FLM 200X20MG BLI kód SÚKL: 0139018
POR TBL FLM 49X20MG TBC kód SÚKL: 0139019
POR TBL FLM 100X20MG TBC kód SÚKL: 0139020
POR TBL FLM 200X20MG TBC kód SÚKL: 0139021
POR TBL FLM 250X20MG TBC kód SÚKL: 0139022
POR TBL FLM 500X20MG TBC kód SÚKL: 0139023

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Uchovávat při teplotě do 25°C.

1. Blistry: uchovávat v původním obalu.

2. Plastové nádobky: nádobku těsně uzavírat.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

IRINOXIN 20 mg/ml

44/630/09-C

DR: O RP: 44/014/98-C

D: VALEANT CZECH PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg
(odp. Irinotecanum 86.65 mg) v 5 ml

PP: Čirý, žlutý roztok.

2 ml lahvičky z tmavého skla typu I, uzavřené pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem flip-off s PP diskem.

5 ml lahvičky z tmavého skla typu I, uzavřené pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem flip-off s PP diskem.

B: INF CNC SOL 1X2ML/40MG VIA kód SÚKL: 0138605

INF CNC SOL 1X5ML/100MG VIA kód SÚKL: 0138606

IS: Cytostatica

ATC: L01XX19

PE: 30

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, při teplotě do 25°C. Nemrazit.

ZI: Irinotekan je určen k léčbě nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem: - v kombinaci s 5-fluorouracilem a kyselinou folinovou u nemocných bez předchozí

chemoterapie pokročilého onemocnění - v monoterapii u pacientů s progresí, u kterých selhala léčba standardním režimem obsahujícím 5-fluorouracil Irinotekan v kombinaci s cetuximabem je indikován k léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem exprimujícím receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) po selhání cytotoxické léčby obsahující irinotekan. Irinotekan v kombinaci s 5-fluorouracilem, kyselinou folinovou a bevacizumabem je indikován k léčbě první linie u pacientů metastatickým karcinomem tlustého střeva nebo konečníku.

OLANZAPIN INVENT FARMA 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
68/637/09-C

DR: OC RP: 99/125/002-EU1

D: INVENT FARMA, S.L., SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), Španělsko

S: Olanzapinum 10 mg

PP: Žlutá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami.

PA/hliník/PVC/hliník/PETP odtrhovací blistry.

B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0134810

POR TBL DIS 35X10MG BLI kód SÚKL: 0134811

POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0134812

POR TBL DIS 70X10MG BLI kód SÚKL: 0134813

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AH03

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.

OLANZAPIN INVENT FARMA 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
68/636/09-C

DR: OC RP: 99/125/001-EU1

D: INVENT FARMA, S.L., SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), Španělsko

S: Olanzapinum 5 mg

PP: Žlutá kulatá plochá tableta se zkosenými hranami.

PA/hliník/PVC/hliník/PETP odtrhovací blistry.

B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0134806

POR TBL DIS 35X5MG BLI kód SÚKL: 0134807

POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0134808

POR TBL DIS 70X5MG BLI kód SÚKL: 0134809

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AH03

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.

OLANZAPIN VIKETO 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
68/639/09-C

DR: OC RP: 99/125/002-EU1

D: INVENT FARMA, S.L., SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), Španělsko

S: Olanzapinum 10 mg

PP: Žlutá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami.

PA/hliník/PVC/hliník/PETP odtrhovací blistry.

B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0134802

POR TBL DIS 35X10MG BLI kód SÚKL: 0134803

POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0134804

POR TBL DIS 70X10MG BLI kód SÚKL: 0134805

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AH03

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.

OLANZAPIN VIKETO 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
68/638/09-C

DR: OC RP: 99/125/001-EU1

D: INVENT FARMA, S.L., SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), Španělsko

S: Olanzapinum 5 mg

PP: Žlutá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami.

PA/hliník/PVC/hliník/PETP odtrhovací blistry.

B: POR TBL DIS 28X5 MG BLI kód SÚKL: 0134798

POR TBL DIS 35X5 MG BLI kód SÚKL: 0134799

POR TBL DIS 56X5 MG BLI kód SÚKL: 0134800

POR TBL DIS 70X5 MG BLI kód SÚKL: 0134801

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AH03

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.

OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU 44/624/09-C

DR: O RP: 44/033/06-C

D: FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC., HAMPSHIRE, Velká Británie

S: Oxaliplatinum 50 mg v 10 ml

PP: Čirý, bezbarvý roztok.

10 ml koncentrátu v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s chlorobutylovou elastomerovou zátkou.

20 ml koncentrátu v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s chlorobutylovou elastomerovou zátkou.

B: INF CNC SOL 1X10ML VIA kód SÚKL: 0128132
INF CNC SOL 1X20ML VIA kód SÚKL: 0128133

IS: Cytostatica

ATC: L01XA03

PE: 24

ZS: Chraňte před mrazem. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: V kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) : adjuvantní léčba stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po kompletní resekci primárního tumoru, léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu.
