

KOD	NÁZEV	DOPLNĚK	Maximální cena výrobce 01/2009	Maximální cena výrobce 04/2008	rozdíl cen [2008-2007]
27287	REPLAGAL	INF CNC SOL 1X3.5MG	42 670,71	59 119,00	-16 448,29
26097	MYOZYME 50 MG	INF PLV CSL 10X50MG/LAH	136 142,23	188 152,80	-52 010,57
28409	ORFADIN 10 MG	POR CPS DUR 60X10MG	74 958,62	84 750,00	-9 791,38
27034	ZAVESCA 100 MG	POR CPS DUR 84X100MG	173 442,88	212 591,67	-39 148,79
27740	TRACLEER 125 MG	POR TBL FLM 56X125MG	67 412,60	87 274,50	-19 861,90
26201	BUSILVEX	INF CNC SOL 8X10ML	53 734,08	73 254,13	-19 520,05
28139	LITAK	INJ SOL 1X5ML	7 996,19	9 715,97	-1 719,78
28026	GLIVEC 100 MG	POR TBL FLM 60X100MG	29 405,52	41 317,15	-11 911,63
28028	GLIVEC 400 MG	POR TBL FLM 30X400MG	59 185,72	82 635,27	-23 449,55
27800	TRISENOX 1MG/ML	INJ CNC SOL 10X10ML	96 019,41	111 849,28	-15 829,87
47614	THROMBOREDUCTIN 0,5 MG	POR CPS DUR 100X0.5MG	9 173,83	13 243,73	-4 069,90
23590	DUODOPA	GST GEL 7X100ML	18 688,64	24 894,55	-6 205,91

Informace o použití:

Replagal je indikován k dlouhodobé terapii u pacientů s potvrzenou diagnózou Fabryho nemoci

Myozyme je indikován pro dlouhodobou léčbu u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci

Orfadin je indikován k léčbě pacientů s potvrzenou diagnózou dědičné tyrosinémie typu 1.

Zavesca je indikována k léčbě mírné až střední formy Gaucherovy choroby typu I

Tracleer, který slouží k léčbě plicní arteriální hypertenze

Busilvex je indikován jako podpůrná léčba před konvenční transplantací hematopoetických progenitorových buněk

Litak je indikován k léčbě trichocelulární leukémie.

Glivec určeného na léčbu více typů leukémie.

Trisenox je indikován u relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémie..

Thromboreductin je indikován k léčbě esenciální trombocytémie.

Duodopa je indikována u pokročilé Parkinsonovy nemoci.